



**Biblioteca
Cochrane**

Base de Datos **Cochrane** de Revisiones Sistemáticas

Efectividad de diferentes estilos de traspaso de enfermería para asegurar la continuidad de la información en pacientes hospitalizados (Revisión)

Smeulers M, Lucas C, Vermeulen H

Smeulers M, Lucas C, Vermeulen H.

Effectiveness of different nursing handover styles for ensuring continuity of information in hospitalised patients (Efectividad de diferentes estilos de traspaso de enfermería para asegurar la continuidad de la información en pacientes hospitalizados).

Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009979.

DOI: [10.1002/14651858.CD009979.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD009979.pub2).

www.cochranelibrary.com/es

Efectividad de diferentes estilos de traspaso de enfermería para asegurar la continuidad de la información en pacientes hospitalizados (Revisión)

Copyright © 2014 The Cochrane Collaboration. Publicada por John Wiley & Sons, Ltd.

WILEY

[Revisión de intervención]

Efectividad de diferentes estilos de traspaso de enfermería para asegurar la continuidad de la información en pacientes hospitalizados

Marian Smeulers¹, Cees Lucas², Hester Vermeulen^{3,4,5}¹Department of Quality Assurance & Process Innovation, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.²Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics, Academic Medical Centre, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands. ³Department of Surgery, Academic Medical Centre at the University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands. ⁴Amsterdam School of Health Professions (ASHP), University of Applied Sciences, Amsterdam, Netherlands. ⁵Faculty of Nursing, Amsterdam School of Health Professions, University of Applied Sciences Amsterdam, Amsterdam, Netherlands**Contacto:** Marian Smeulers, m.smeulers@amc.nl.**Grupo Editorial:** Grupo Cochrane para una Práctica y Organización Sanitaria Efectivas.**Estado y fecha de publicación:** Editada (sin cambios en las conclusiones), publicada en el número 9, 2021.**Referencia:** Smeulers M, Lucas C, Vermeulen H. Effectiveness of different nursing handover styles for ensuring continuity of information in hospitalised patients (Efectividad de diferentes estilos de traspaso de enfermería para asegurar la continuidad de la información en pacientes hospitalizados). *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2014, Issue 6. Art. No.: CD009979. DOI: [10.1002/14651858.CD009979.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD009979.pub2).

Copyright © 2014 The Cochrane Collaboration. Publicada por John Wiley & Sons, Ltd.

RESUMEN

Antecedentes

Un traspaso exacto de la información clínica es de gran importancia para la continuidad y la seguridad de la atención. Si la información clínicamente relevante no se comparte con exactitud y en el momento adecuado puede provocar eventos adversos, retrasos en el tratamiento y el diagnóstico, tratamiento inapropiado y omisión de la atención. Durante la última década ha aumentado la necesidad de intervenciones para mejorar los trasposos. Estas intervenciones intentan reducir el riesgo de la falta de comunicación, los malentendidos y la omisión de información crítica.

Objetivos

Determinar la efectividad de las intervenciones diseñadas para mejorar el traspaso de enfermería en los hospitales, específicamente:

identificar qué estilo o estilos de traspaso de enfermería se asocian con mejores resultados para los pacientes en el contexto hospitalario y qué estilos de traspaso de enfermería se asocian con mejores resultados del proceso de enfermería.

Métodos de búsqueda

Se buscaron los estudios primarios en las siguientes bases de datos electrónicas: registro especializado del Grupo Cochrane para una Práctica y Organización Sanitaria Efectivas (Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group, EPOC), (hasta el 19 de septiembre de 2012), Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of Controlled Trials) (CENTRAL) (hasta el 1 de marzo de 2013), MEDLINE (1950 hasta el 1 de marzo de 2013) OvidSP, EMBASE (1947 hasta el 1 de marzo de 2013) OvidSP, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) (1980 hasta el 1 de marzo de 2013) EbscoHost y ISI Web of Knowledge (Science Citation Index and Social Sciences Citation Index) (hasta el 9 de julio de 2012). Se realizaron búsquedas de revisiones relacionadas en la Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE). Además, se revisaron las listas de referencias de los estudios incluidos y las revisiones relevantes. También se hicieron búsquedas en la WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) <http://www.who.int/ictpr/en/> en Current Controlled Trials www.controlled-trials.com/mrct y también se realizó una búsqueda en los sitios web de literatura gris.

Criterios de selección

Ensayos controlados aleatorios (ECA o ECA grupales) que evaluaran cualquier estilo de traspaso de enfermería entre el personal de enfermería en un contexto hospitalario con el objetivo de prevenir los eventos adversos u optimizar la transferencia de la información fundamental exacta requerida para la continuidad de la atención, o ambos.

Obtención y análisis de los datos

Dos revisores de forma independiente evaluaron la calidad de los ensayos y extrajeron los datos.

Resultados principales

La búsqueda identificó 2178 citas, 28 de las cuales fueron consideradas potencialmente relevantes. Después de la revisión independiente del texto completo de estos estudios no se identificaron estudios elegibles para inclusión en esta revisión debido a la falta de estudios con un diseño controlado aleatorio.

Conclusiones de los autores

No hubo pruebas disponibles para apoyar las conclusiones acerca de la efectividad de los estilos de traspaso de enfermería para asegurar la continuidad de la información en los pacientes hospitalizados porque no se encontraron estudios que cumplieran los criterios metodológicos de esta revisión. Por lo tanto, persiste la incertidumbre acerca de la práctica más eficaz. Los esfuerzos de los estudios de investigación se deben centrar en el fortalecimiento de las pruebas acerca de la efectividad de los estilos de traspaso de enfermería mediante estudios rigurosos bien diseñados. Según el conocimiento actual, se pueden aplicar los siguientes principios orientadores cuando se rediseñe el proceso de traspaso de enfermería: comunicación directa, documentación estructurada, implicación del paciente y uso de tecnología IT para apoyar el proceso.

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS

¿Cuál es el mejor estilo de traspaso de enfermería para asegurar la continuidad de la información en pacientes hospitalizados?

¿Qué es un traspaso de enfermería?

Un traspaso de enfermería ocurre cuando una enfermera transfiere la responsabilidad de la atención de un paciente a otra enfermera, por ejemplo, al final de un turno de enfermería. Como promedio, los trasposos de enfermería ocurren tres veces al día para cada paciente.

¿Qué estilos de traspaso existen?

En la práctica diaria los trasposos se hacen de diversas maneras, algunos trasposos se hacen a través de conversación entre las enfermeras (trasposos verbales). Otros se hacen a través de la lectura por parte de las enfermeras de las notas médicas del paciente o mediante una combinación de lectura y conversación entre ellas. En algunos casos se hacen en la cabecera del paciente para que el paciente pueda contribuir si lo desea.

¿Por qué es necesario investigar el estilo de los trasposos de enfermería?

Cuando una enfermera le transfiere la responsabilidad de la atención a otra enfermera existe la posibilidad de error si toda la información médica importante no se comparte de manera cuidadosa y eficiente. No lograr mencionar (o recibir) la información puede dar lugar a retrasos en el tratamiento o el diagnóstico del paciente, un tratamiento inapropiado o a no proporcionar la atención apropiada. Por lo tanto, un traspaso exacto de la información clínica es fundamental para asegurar la continuidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

El propósito y las conclusiones de esta revisión

Esta revisión trató de determinar qué estilo de traspaso de enfermería funciona mejor.

En marzo de 2013 los revisores realizaron una búsqueda amplia de estudios relevantes apropiados (estudios controlados aleatorios) que compararan diferentes estilos de traspaso de enfermería. Sin embargo, no fueron capaces de identificar estudios controlados aleatorios que investigaran la pregunta y no fue posible establecer conclusiones. Se necesitan con urgencia más estudios de investigación en esta área.